

ஜனவரி 2022

பின்பற்றப்பட வேண்டிய நடைமுறைகள்

- எண்ணெய்ப்பனையை 9 மீ இடைவெளியில் அறுகோண அல்லது சதுர முறையில் நடவு செய்து நீர்ப்பாய்ச்சவும்.
- முதிர் தோப்புகளில் ஒரு பனைக்கு ஒரு நாளைக்கு 160 லிட்டர் நீர் என்ற அளவில் நீர்ப்பாசனம் செய்யவும்.
- கிளைபோசேட் அம்மோனியா / பாராகுவாட் களைக்கொல்லியை ஒரு லிட்டர் தண்ணீருக்கு 2.5 மிலி என்ற அளவில் கலந்து பனையின் பாத்தி பகுதியில் தெளிக்கவும்.
- முதிர் தோப்புகளுக்கு மாதாந்திர உரமாக ஒரு ஏக்கருக்கு 5 கிலோ யூரியா, 3 கிலோ டிஎபி மற்றும் 5 கிலோ எம்ஓபி என்ற அளவில் பாசனவழி (fertigation) மூலம் உரமிடவும்.
- இளந்தோப்புகளில் முதல் 3 ஆண்டுகள் வரை பூ நீக்கும் கருவி மூலம் ஆண் மற்றும் பெண் பூக்களை நீக்கவும்.
- பனையின் பாத்திப்பகுதியில் துண்டாக்கப்பட்ட இலைகள், ஆண் மஞ்சரி மற்றும் வெற்று பழக்குலைகளைக் கொண்டு மூடாக்கை உருவாக்கவும்.
- இளந்தோப்புகளில் உளியை (chisel) கொண்டும் முதிர் தோப்புகளில் அலுமினிய கம்பத்தில் (aluminium pole) பொருத்தப்பட்டுள்ள அரிவாளைக்கொண்டும் பழக்குலைகளை அறுவடை செய்யவும். அவ்வாறு அறுவடை செய்யும் போது பழக்குலைகளின் காம்பு 5 செ.மீ. க்கு மிகாமல் பார்த்துக்கொள்ளவும்.
- எண்ணெய்ப்பனையின் பாத்தி பகுதியில் உழவு செய்யக்கூடாது.

பிப்ரவரி 2022

பின்பற்றப்பட வேண்டிய நடைமுறைகள்

- எண்ணெய்ப்பனையை 9 மீ இடைவெளியில் அறுகோண அல்லது சதுர முறையில் நடவு செய்து நீர்ப்பாய்ச்சவும்.
- முதிர் தோப்புகளில் ஒரு பனைக்கு ஒரு நாளைக்கு 200 லிட்டர் நீர் என்ற அளவில் நீர்ப்பாசனம் செய்யவும்.
- முதிர் தோப்புகளுக்கு மாதாந்திர உரமாக ஒரு ஏக்கருக்கு 5 கிலோ யூரியா, 3 கிலோ டிஎபி மற்றும் 5 கிலோ எம்ஓபி என்ற அளவில் பாசனவழி (fertigation) மூலம் உரமிடவும்.
- ஒவ்வொரு பனைக்கும் நுண்ணூட்டச்சத்துக்களான மெக்னீசியம் சல்பேட் 250 கிராம் மற்றும் போராக்ஸ் 50 கிராம் என்ற அளவில் இடவும்.
- இளந்தோப்புகளில் முதல் 3 ஆண்டுகள் வரை பூ நீக்கும் கருவி மூலம் ஆண் மற்றும் பெண் பூக்களை நீக்கவும்.
- பனையின் பாத்திப்பகுதியில் துண்டாக்கப்பட்ட இலைகள், ஆண் மஞ்சரி மற்றும் வெற்று பழக்குலைகளைக் கொண்டு மூடாக்கை உருவாக்கவும்.
- பைப்புழு / இலை வலைப்புழு / நத்தைக் கம்பளிப்பூச்சி தாக்குதலை கண்காணிக்கவும், தென்பட்டால் லாம்ப்டா சைஹாலோத்ரின் ஒரு மிலிக்கு ஒரு லிட்டர் தண்ணீர் என்ற அளவில் கலந்து தெளிக்கவும்.
- இளந்தோப்புகளில் உளியை (chisel) கொண்டும் முதிர் தோப்புகளில் அலுமினிய கம்பத்தில் (aluminium pole) பொருத்தப்பட்டுள்ள அரிவாளைக்கொண்டும் பழக்குலைகளை அறுவடை செய்யவும். அவ்வாறு அறுவடை செய்யும் போது பழக்குலைகளின் காம்பு 5 செ.மீ. க்கு மிகாமல் பார்த்துக்கொள்ளவும்.
- எண்ணெய்ப்பனையின் பாத்தி பகுதியில் உழவு செய்ய செய்யக்கூடாது.

மார்ச் 2022

பின்பற்றப்பட வேண்டிய நடைமுறைகள்

- எண்ணெய்ப்பனையை 9 மீ இடைவெளியில் அறுகோண அல்லது சதுர முறையில் நடவு செய்து நீர்ப்பாய்ச்சவும்.
- முதிர் தோப்புகளில் ஒரு பனைக்கு ஒரு நாளைக்கு 250 லிட்டர் நீர் என்ற அளவில் நீர்ப்பாசனம் செய்யவும்.
- முதிர் தோப்புகளுக்கு மாதாந்திர உரமாக ஒரு ஏக்கருக்கு 5 கிலோ யூரியா, 3 கிலோ டிஎபி மற்றும் 5 கிலோ எம்ஓபி என்ற அளவில் பாசனவழி (fertigation) மூலம் உரமிடவும்.
- இளந்தோப்புகளில் முதல் 3 ஆண்டுகள் வரை பூ நீக்கும் கருவி மூலம் ஆண் மற்றும் பெண் பூக்களை நீக்கவும்.
- பனையின் பாத்திப்பகுதியில் துண்டாக்கப்பட்ட இலைகள், ஆண் மஞ்சரி மற்றும் வெற்று பழக்குலைகளைக் கொண்டு மூடாக்கை உருவாக்கவும்.
- இளந்தோப்புகளில் உளியை (chisel) கொண்டும் முதிர் தோப்புகளில் அலுமினிய கம்பத்தில் (aluminium pole) பொருத்தப்பட்டுள்ள அரிவாளைக்கொண்டும் பழக்குலைகளை அறுவடை செய்யவும். அவ்வாறு அறுவடை செய்யும் போது பழக்குலைகளின் காம்பு 5 செ.மீ. க்கு மிகாமல் பார்த்துக்கொள்ளவும்.
- முதிர் தோப்புகளுக்கு அடியுரமாக ஒரு பனைக்கு 650 கிராம் யூரியா, 940 கிராம் எஸ்எஸ்பி, 500 கிராம் எம்ஓபி என்ற அளவிலோ அல்லது மண் மற்றும் இலை ஊட்டச்சத்து பகுப்பாய்வு அடிப்படையிலோ உரமிடவும்.
- எண்ணெய்ப்பனையின் பாத்தி பகுதியில் உழவு செய்ய செய்யக்கூடாது.

ஏப்ரல் 2022

பின்பற்றப்பட வேண்டிய நடைமுறைகள்

- பனையின் இளம்பருவத்தில் பாத்தி பகுதியில் சண்ப்பையை பசுந்தாள் உரமாக விதைக்கவும்.
- முதிர் தோப்புகளில் ஒரு பனைக்கு ஒரு நாளைக்கு 265 லிட்டர் நீர் என்ற அளவில் நீர்ப்பாசனம் செய்யவும்.
- கிளைபோசேட் அம்மோனியா / பாராகுவாட் களைக்கொல்லியை ஒரு லிட்டர் தண்ணீருக்கு 2.5 மிலி என்ற அளவில் கலந்து பனையின் பாத்தி பகுதியில் தெளிக்கவும்.
- முதிர் தோப்புகளுக்கு மாதாந்திர உரமாக ஒரு ஏக்கருக்கு 5 கிலோ யூரியா, 3 கிலோ டிஎபி மற்றும் 5 கிலோ எம்ஓபி என்ற அளவில் பாசனவழி (fertigation) மூலம் உரமிடவும்.
- இளந்தோப்புகளில் முதல் 3 ஆண்டுகள் வரை பூ நீக்கும் கருவி மூலம் ஆண் மற்றும் பெண் பூக்களை நீக்கவும்.
- பனையின் பாத்திப்பகுதியில் துண்டாக்கப்பட்ட இலைகள், ஆண் மஞ்சரி மற்றும் வெற்று பழக்குலைகளைக் கொண்டு மூடாக்கை உருவாக்கவும்.
- மண் மற்றும் இலை மாதிரியை ஊட்டச்சத்து பகுப்பாய்வு ஆய்வுக்கு அனுப்பவும்.
- இளந்தோப்புகளில் உளியை (chisel) கொண்டும் முதிர் தோப்புகளில் அலுமினிய கம்பத்தில் (aluminium pole) பொருத்தப்பட்டுள்ள அரிவாளைக்கொண்டும் பழக்குலைகளை அறுவடை செய்யவும். அவ்வாறு அறுவடை செய்யும் போது பழக்குலைகளின் காம்பு 5 செ.மீ. க்கு மிகாமல் பார்த்துக்கொள்ளவும்.
- எண்ணெய்ப்பனையின் பாத்தி பகுதியில் உழவு செய்யக்கூடாது.

பின்பற்றப்பட வேண்டிய நடைமுறைகள்

- இளந்தோப்புகளில் பனையின் பாத்தி பகுதியில் சணப்பையை பசுந்தாள் உரமாக விதைக்கவும்
- முதிர் தோப்புகளில் ஒரு பனைக்கு ஒரு நாளைக்கு 265 லிட்டர் நீர் என்ற அளவிலும் கடும்கோடை காலத்தில் ஒரு பனைக்கு ஒரு நாளைக்கு 350 லிட்டர் நீர் என்ற அளவிலும் நீர்ப்பாசனம் செய்யவும்.
- முதிர் தோப்புகளுக்கு மாதாந்திர உரமாக ஒரு ஏக்கருக்கு 5 கிலோ யூரியா, 3 கிலோ டிஎபி மற்றும் 5 கிலோ எம்ஓபி என்ற அளவில் பாசனவழி (fertigation) மூலம் உரமிடவும்.
- இளந்தோப்புகளில் முதல் 3 ஆண்டுகள் வரை பூ நீக்கும் கருவி மூலம் ஆண் மற்றும் பெண் பூக்களை நீக்கவும்.
- பனையின் பாத்திப்பகுதியில் துண்டாக்கப்பட்ட இலைகள், ஆண் மஞ்சரி மற்றும் வெற்று பழக்குலைகளைக் கொண்டு மூடாக்கை உருவாக்கவும்.
- தேவைக்கேற்ப மட்டை / இலை நீக்கம் செய்யவும் மேலும் குறைந்தபட்சம் ஒரு பனையில் 35 இலைகள் உள்ளவாறு பார்த்துக்கொள்ளவும்.
- ஏப்ரல் மாதத்தில் மண் மற்றும் இலை மாதிரியை சேகரித்து ஊட்டச்சத்து பகுப்பாய்வு அனுப்பாதிருந்தால் இப்பொழுது சேகரித்து அனுப்பவும்.
- இளந்தோப்புகளில் உளியை (chisel) கொண்டும் முதிர் தோப்புகளில் அலுமினிய கம்பத்தில் (aluminium pole) பொருத்தப்பட்டுள்ள அரிவாளைக்கொண்டும் பழக்குலைகளை அறுவடை செய்யவும். அவ்வாறு அறுவடை செய்யும் போது பழக்குலைகளின் காம்பு 5 செ.மீ. க்கு மிகாமல் பார்த்துக்கொள்ளவும்.

ஜூன் 2022

பின்பற்றப்பட வேண்டிய நடைமுறைகள்

- எண்ணெய்ப்பனையை 9 மீ இடைவெளியில் அறுகோண அல்லது சதுர முறையில் நடவு செய்து நீர்ப்பாய்ச்சவும்.
- முதிர் தோப்புகளில் ஒரு பனைக்கு ஒரு நாளைக்கு 220 லிட்டர் நீர் என்ற அளவிலோ அல்லது மழைப்பொழிவு / மண் ஈரப்பத்தை பொருத்து தேவையான அளவு நீர்ப்பாசனம் செய்யவும்.
- சண்ப்பையை அறுவடை செய்து பனையின் பாத்திப்பகுதியில் மூடாக்காக இடவும்.
- முதிர் தோப்புகளுக்கு மாதாந்திர உரமாக ஒரு ஏக்கருக்கு 5 கிலோ யூரியா, 3 கிலோ டிஎபி மற்றும் 5 கிலோ எம்ஓபி என்ற அளவில் பாசனவழி (fertigation) மூலம் உரமிடவும்.
- முதிர் தோப்புகளுக்கு அடியுரமாக ஒரு பனைக்கு 650 கிராம் யூரியா, 940 கிராம் எஸ்எஸ்பி, 500 கிராம் எம்ஓபி என்ற அளவிலோ அல்லது மண் மற்றும் இலை ஊட்டச்சத்து பகுப்பாய்வு அடிப்படையிலோ உரமிடவும்.
- இளந்தோப்புகளில் முதல் 3 ஆண்டுகள் வரை பூ நீக்கும் கருவி மூலம் ஆண் மற்றும் பெண் பூக்களை நீக்கவும்.
- மொட்டு அழுகல் நோயைக் கட்டுப்படுத்த குளோரோதலோனில் 10 கிராமுக்கு ஒரு லிட்டர் தண்ணீர் என்ற அளவில் கலந்து (100-250 மி.லி. கரைசலை தலைப்பகுதியின் நடுவில்) தெளிக்கவும்.
- காண்டாமிருக வண்டுகளை கட்டுப்படுத்த 20 கிராம் ஃபோரேட்டை துளையிடப்பட்ட சிறிய பைகளில் அடைத்து பனையின் தலைப்பகுதியில் வைக்கவும்.
- இளந்தோப்புகளில் உளியை (chisel) கொண்டும் முதிர் தோப்புகளில் அலுமினிய கம்பத்தில் (aluminium pole) பொருத்தப்பட்டுள்ள அரிவாளைக்கொண்டும் பழக்குலைகளை அறுவடை செய்யவும். அவ்வாறு அறுவடை செய்யும் போது பழக்குலைகளின் காம்பு 5 செ.மீ. க்கு மிகாமல் பார்த்துக்கொள்ளவும்.

ஜூலை 2022

பின்பற்றப்பட வேண்டிய நடைமுறைகள்

- எண்ணெய்ப்பனையை 9 மீ இடைவெளியில் அறுகோண அல்லது சதுர முறையில் நடவு செய்து நீர்ப்பாய்ச்சவும்.
- முதிர் தோப்புகளில் ஒரு பனைக்கு ஒரு நாளைக்கு 120 லிட்டர் நீர் என்ற அளவிலோ அல்லது மழைப்பொழிவு / மண் ஈரப்பத்தை பொருத்து தேவையான அளவு நீர்ப்பாசனம் செய்யவும்.
- முதிர் தோப்புகளுக்கு மாதாந்திர உரமாக ஒரு ஏக்கருக்கு 5 கிலோ யூரியா, 3 கிலோ டிஎபி மற்றும் 5 கிலோ எம்ஓபி என்ற அளவில் பாசனவழி (fertigation) மூலம் உரமிடவும்.
- இளந்தோப்புகளில் முதல் 3 ஆண்டுகள் வரை பூ நீக்கும் கருவி மூலம் ஆண் மற்றும் பெண் பூக்களை நீக்கவும்.
- மொட்டு அழுகல் நோயைக் கட்டுப்படுத்த குளோரோதலோனில் 10 கிராமுக்கு ஒரு லிட்டர் தண்ணீர் என்ற அளவில் கலந்து (100-250 மி.லி. கரைசலை தலைப்பகுதியின் நடுவில்) தெளிக்கவும்.
- காண்டாமிருக வண்டுகளை கட்டுப்படுத்த 20 கிராம் ஃபோரேட்டை துளையிடப்பட்ட சிறிய பைகளில் அடைத்து பனையின் தலைப்பகுதியில் வைக்கவும்.
- இளந்தோப்புகளில் உளியை (chisel) கொண்டும் முதிர் தோப்புகளில் அலுமினிய கம்பத்தில் (aluminium pole) பொருத்தப்பட்டுள்ள அரிவாளைக்கொண்டும் பழக்குலைகளை அறுவடை செய்யவும். அவ்வாறு அறுவடை செய்யும் போது பழக்குலைகளின் காம்பு 5 செ.மீ. க்கு மிகாமல் பார்த்துக்கொள்ளவும்.

ஆகஸ்ட் 2022

பின்பற்றப்பட வேண்டிய நடைமுறைகள்

- எண்ணெய்ப்பனையை 9 மீ இடைவெளியில் அறுகோண அல்லது சதுர முறையில் நடவு செய்து நீர்ப்பாய்ச்சவும்.
- முதிர் தோப்புகளில் ஒரு பனைக்கு ஒரு நாளைக்கு 100 லிட்டர் நீர் என்ற அளவிலோ அல்லது மழைப்பொழிவு / மண் ஈரப்பத்தை பொருத்து தேவையான அளவு நீர்ப்பாசனம் செய்யவும்.
- முதிர் தோப்புகளுக்கு மாதாந்திர உரமாக ஒரு ஏக்கருக்கு 5 கிலோ யூரியா, 3 கிலோ டிஎபி மற்றும் 5 கிலோ எம்ஓபி என்ற அளவில் பாசனவழி (fertigation) மூலம் உரமிடவும்.
- ஒரு பனைக்கு நுண்ணூட்டச்சத்துக்களான மெக்னீசியம் சல்பேட் 250 கிராம் மற்றும் போராக்ஸ் 50 கிராம் என்ற அளவில் இடவும்.
- இளந்தோப்புகளில் முதல் 3 ஆண்டுகள் வரை பூ நீக்கும் கருவி மூலம் ஆண் மற்றும் பெண் பூக்களை நீக்கவும்.
- பனையின் பாத்திப்பகுதியில் துண்டாக்கப்பட்ட இலைகள், ஆண் மஞ்சரி மற்றும் வெற்று பழக்குலைகளைக் கொண்டு மூடாக்கை உருவாக்கவும்.
- இளந்தோப்புகளில் உளியை (chisel) கொண்டும் முதிர் தோப்புகளில் அலுமினிய கம்பத்தில் (aluminium pole) பொருத்தப்பட்டுள்ள அரிவாளைக்கொண்டும் பழக்குலைகளை அறுவடை செய்யவும். அவ்வாறு அறுவடை செய்யும் போது பழக்குலைகளின் காம்பு 5 செ.மீ. க்கு மிகாமல் பார்த்துக்கொள்ளவும்.

செப்டம்பர் 2022

பின்பற்றப்பட வேண்டிய நடைமுறைகள்

- எண்ணெய்ப்பனையை 9 மீ இடைவெளியில் அறுகோண அல்லது சதுர முறையில் நடவு செய்து நீர்ப்பாய்ச்சவும்.
- முதிர் தோப்புகளில் ஒரு பனைக்கு ஒரு நாளைக்கு 145 லிட்டர் நீர் என்ற அளவிலோ அல்லது மழைப்பொழிவு / மண் ஈரப்பத்தை பொருத்து தேவையான அளவு நீர்ப்பாசனம் செய்யவும்.
- முதிர் தோப்புகளுக்கு மாதாந்திர உரமாக ஒரு ஏக்கருக்கு 5 கிலோ யூரியா, 3 கிலோ டிஎபி மற்றும் 5 கிலோ எம்ஓபி என்ற அளவில் பாசனவழி (fertigation) மூலம் உரமிடவும்.
- முதிர் தோப்புகளுக்கு அடியுரமாக ஒரு பனைக்கு 650 கிராம் யூரியா, 940 கிராம் எஸ்எஸ்பி, 500 கிராம் எம்ஓபி என்ற அளவிலோ அல்லது மண் மற்றும் இலை ஊட்டச்சத்து பகுப்பாய்வு அடிப்படையிலோ உரமிடவும்.
- இளந்தோப்புகளில் முதல் 3 ஆண்டுகள் வரை பூ நீக்கும் கருவி மூலம் ஆண் மற்றும் பெண் பூக்களை நீக்கவும்.
- பனையின் பாத்திப்பகுதியில் துண்டாக்கப்பட்ட இலைகள், ஆண் மஞ்சரி மற்றும் வெற்று பழக்குலைகளைக் கொண்டு மூடாக்கை உருவாக்கவும்.
- இளந்தோப்புகளில் உளியை (chisel) கொண்டும் முதிர் தோப்புகளில் அலுமினிய கம்பத்தில் (aluminium pole) பொருத்தப்பட்டுள்ள அரிவாளைக்கொண்டும் பழக்குலைகளை அறுவடை செய்யவும். அவ்வாறு அறுவடை செய்யும் போது பழக்குலைகளின் காம்பு 5 செ.மீ. க்கு மிகாமல் பார்த்துக்கொள்ளவும்.

அக்டோபர் 2022

பின்பற்றப்பட வேண்டிய நடைமுறைகள்

- எண்ணெய்ப்பனையை 9 மீ இடைவெளியில் அறுகோண அல்லது சதுர முறையில் நடவு செய்து நீர்ப்பாய்ச்சவும்.
- பைப்புழு / இலை உண்ணும் கம்பளிப்பூச்சி தாக்குதலை கண்காணிக்கவும், தென்பட்டால் லாம்ப்டா சைஹாலோத்ரின் ஒரு மிலிக்கு ஒரு லிட்டர் தண்ணீர் என்ற அளவில் கலந்து தெளிக்கவும்.
- முதிர் தோப்புகளில் ஒரு பனைக்கு ஒரு நாளைக்கு 140 லிட்டர் நீர் என்ற அளவிலோ அல்லது மழைப்பொழிவு / மண் ஈரப்பத்தை பொருத்து தேவையான அளவு நீர்ப்பாசனம் செய்யவும்.
- முதிர் தோப்புகளுக்கு மாதாந்திர உரமாக ஒரு ஏக்கருக்கு 5 கிலோ யூரியா, 3 கிலோ டிஎபி மற்றும் 5 கிலோ எம்ஓபி என்ற அளவில் பாசனவழி (fertigation) மூலம் உரமிடவும்.
- இளந்தோப்புகளில் முதல் 3 ஆண்டுகள் வரை பூ நீக்கும் கருவி மூலம் ஆண் மற்றும் பெண் பூக்களை நீக்கவும்.
- இளந்தோப்புகளில் உளியை (chisel) கொண்டும் முதிர் தோப்புகளில் அலுமினிய கம்பத்தில் (aluminium pole) பொருத்தப்பட்டுள்ள அரிவாளைக்கொண்டும் பழக்குலைகளை அறுவடை செய்யவும். அவ்வாறு அறுவடை செய்யும் போது பழக்குலைகளின் காம்பு 5 செ.மீ. க்கு மிகாமல் பார்த்துக்கொள்ளவும்.
- இளந்தோப்புகளில் ஊடுபயிர் பயிரிடலாம்.
- எண்ணெய்ப்பனையின் இலைகளை வெட்டக்கூடாது, கட்டிவைக்கக்கூடாது, பாத்தி பகுதியில் உழவு செய்யக்கூடாது மேலும் ஊடுபயிர்கள் பயிரிடக்கூடாது.

நவம்பர் 2022

பின்பற்றப்பட வேண்டிய நடைமுறைகள்

- எண்ணெய்ப்பனையை 9 மீ இடைவெளியில் அறுகோண அல்லது சதுர முறையில் நடவு செய்து நீர்ப்பாய்ச்சவும்.
- மொட்டு அழுகல் நோயைக் கட்டுப்படுத்த குளோரோதலோனில் 10 கிராமுக்கு ஒரு லிட்டர் தண்ணீர் என்ற அளவில் கலந்து (100-250 மி.லி. கரைசலை தலைப்பகுதியின் நடுவில்) தெளிக்கவும்.
- காண்டாமிருக வண்டுகளை கட்டுப்படுத்த 20 கிராம் ஃபோரேட்டை துளையிடப்பட்ட சிறிய பைகளில் அடைத்து பனையின் தலைப்பகுதியில் வைக்கவும்.
- ஏப்ரல் / மே மாதத்தில் மண் மற்றும் இலை மாதிரியை சேகரித்து ஊட்டச்சத்து பகுப்பாய்வு அனுப்பாதிருந்தால் இப்பொழுது சேகரித்து அனுப்பவும்.
- முதிர் தோப்புகளில் ஒரு பனைக்கு ஒரு நாளைக்கு 170 லிட்டர் நீர் என்ற அளவிலோ அல்லது மழைப்பொழிவு / மண் ஈரப்பத்தை பொருத்து தேவையான அளவு நீர்ப்பாசனம் செய்யவும்.
- முதிர் தோப்புகளுக்கு மாதாந்திர உரமாக ஒரு ஏக்கருக்கு 5 கிலோ யூரியா, 3 கிலோ டிஎபி மற்றும் 5 கிலோ எம்ஓபி என்ற அளவில் பாசனவழி (fertigation) மூலம் உரமிடவும்.
- இளந்தோப்புகளில் முதல் 3 ஆண்டுகள் வரை பூ நீக்கும் கருவி மூலம் ஆண் மற்றும் பெண் பூக்களை நீக்கவும்.
- பனையின் பாத்திப்பகுதியில் துண்டாக்கப்பட்ட இலைகள், ஆண் மஞ்சரி மற்றும் வெற்று பழக்குலைகளைக் கொண்டு மூடாக்கை உருவாக்கவும்.
- இளந்தோப்புகளில் உளியை (chisel) கொண்டும் முதிர் தோப்புகளில் அலுமினிய கம்பத்தில் (aluminium pole) பொருத்தப்பட்டுள்ள அரிவாளைக்கொண்டும் பழக்குலைகளை அறுவடை செய்யவும். அவ்வாறு அறுவடை செய்யும் போது பழக்குலைகளின் காம்பு 5 செ.மீ. க்கு மிகாமல் பார்த்துக்கொள்ளவும்.
- இலைகளை வெட்டக்கூடாது மற்றும் கட்டிவைக்கக்கூடாது.

டிசம்பர் 2022

பின்பற்றப்பட வேண்டிய நடைமுறைகள்

- எண்ணெய்ப்பனையை 9 மீ இடைவெளியில் அறுகோண அல்லது சதுர முறையில் நடவு செய்து நீர்ப்பாய்ச்சவும்.
- மொட்டு அழுகல் நோயைக் கட்டுப்படுத்த குளோரோதலோனில் 10 கிராமுக்கு ஒரு லிட்டர் தண்ணீர் என்ற அளவில் கலந்து (100-250 மி.லி. கரைசலை தலைப்பகுதியின் நடுவில்) தெளிக்கவும்.
- முதிர் தோப்புகளில் ஒரு பனைக்கு ஒரு நாளைக்கு 160 லிட்டர் நீர் என்ற அளவிலோ அல்லது மழைப்பொழிவு / மண் ஈரப்பத்தை பொருத்து தேவையான அளவு நீர்ப்பாசனம் செய்யவும்.
- முதிர் தோப்புகளுக்கு மாதாந்திர உரமாக ஒரு ஏக்கருக்கு 5 கிலோ யூரியா, 3 கிலோ டிஎபி மற்றும் 5 கிலோ எம்ஓபி என்ற அளவில் பாசனவழி (fertigation) மூலம் உரமிடவும்.
- முதிர் தோப்புகளுக்கு அடியுரமாக ஒரு பனைக்கு 650 கிராம் யூரியா, 940 கிராம் எஸ்எஸ்பி, 500 கிராம் எம்ஓபி என்ற அளவிலோ அல்லது மண் மற்றும் இலை ஊட்டச்சத்து பகுப்பாய்வு அடிப்படையிலோ உரமிடவும்.
- இளந்தோப்புகளில் முதல் 3 ஆண்டுகள் வரை பூ நீக்கும் கருவி மூலம் ஆண் மற்றும் பெண் பூக்களை நீக்கவும்.
- பனையின் பாத்திப்பகுதியில் துண்டாக்கப்பட்ட இலைகள், ஆண் மஞ்சரி மற்றும் வெற்று பழக்குலைகளைக் கொண்டு மூடாக்கை உருவாக்கவும்.
- இளந்தோப்புகளில் உளியை (chisel) கொண்டும் முதிர் தோப்புகளில் அலுமினிய கம்பத்தில் (aluminium pole) பொருத்தப்பட்டுள்ள அரிவாளைக்கொண்டும் பழக்குலைகளை அறுவடை செய்யவும். அவ்வாறு அறுவடை செய்யும் போது பழக்குலைகளின் காம்பு 5 செ.மீ. க்கு மிகாமல் பார்த்துக்கொள்ளவும்.
- இலைகளை வெட்டக்கூடாது மற்றும் கட்டிவைக்கக்கூடாது.